





ヤマトシロアリとイエシロアリの違い

	ヤマトシロアリ	イエシロアリ
分 布	主に北海道を除く日本全土に生息	主に関東以南の温暖な海岸沿いに生息
体 長	3.5～6.0mm程度	5.0～9.5mm程度
コロニーの規模	数千匹～数万匹	数十万匹～百万匹
加害速度 範囲	加害速度は比較的遅い。 主に家屋の下部材を加害する。 雨漏り等があればそれ以上を加害する場合もある。 1つの集団は小さく加害範囲も(イエシロアリに比べて)狭い。	加害速度が速い 被害は家屋全体、屋根部材まで及ぶ。 1つの集団が大きく、行動範囲も広い ため周囲数件の家屋に被害をもたらす場合も多い。
加害形態	 <p>加害場所＝巣であることが多い</p>	 <p>加害場所と巣が離れている</p>
羽アリ	4～5月頃の朝方から日中にかけて飛び立ちます。	6～7月頃の夕方以降に飛び立つことが多い。光に集まる習性があり、外灯や窓などに寄ってきます。
見分け方	簡単な見分け方は、頭が茶色い兵蟻の頭部の形に注目します。	
	 <p>頭が大きく四角い形をしています。 蟻道を少し破壊しても、たいていすぐ隠れてしまいます。</p>	 <p>頭がやや丸い形をしています。 攻撃的で、頭部を軽く刺激すると、</p>